





Programas de seguimiento

José Luis Tellería
Grupo de Investigación en Biología Evolutiva
y de la Conservación, Universidad
Complutense, 28040 Madrid, Spain







Programas de seguimiento

- Conceptos generales e indicadores
- Objetivos y diseño
- Uso en ciencia y gestión







Programas de seguimiento

- Conceptos generales e indicadores
- Objetivos y diseño
- Uso en ciencia y gestión





seguimiento

Artículo


Sinónimos o afines

1. m. Acción y efecto de seguir o seguirse.

SIN.: persecución, acorralamiento, hostigamiento, acecho, acoso, búsqueda, rastreo. [de un proceso] observación, vigilancia, supervisión, inspección, control.



Disparidad de aproximaciones








Figura 1.4 (a) Muestra el Índice Planeta Vivo global de 1970 a 2020, basado en el análisis de 34 836 poblaciones de 5495 especies de vertebrados. La línea blanca representa el valor del índice y las áreas sombreadas, la incertidumbre estadística en torno al valor.





Perspective

A Conceptual Framework for Biodiversity Monitoring Programs in Conservation Areas

Daniel T. Dalton ^{1,*}, Vanessa Berger ¹, Vanessa Adams ², Judith Botha ³, Stephan Halloy ⁴, Hanns Kirchmeir ⁵, Andrej Sovinc ⁶, Klaus Steinbauer ^{1,5}, Vid Švara ¹ and Michael Jungmeier ¹

Disparidad de indicadores directos

2023


Table 1. The Essential Biodiversity Variables by class and name. Adapted from: Pereira et al. [34]; https://geobon.org/ebvs/what-are-ebvs/ (accessed on 16 March 2023).







	EBV Class	Name	
1	Genetic composition	Genetic diversity—richness and heterozygosity Genetic differentiation—number of genetic units and genetic distance Effective population size Inbreeding	
2	Species populations	Species distributions Species abundances	
3	Species traits	Morphology Physiology Phenology Movement Reproduction	Creciente complejidad y posibilidades de comparación)análisis) entre índices
4	Community composition	Community abundance Taxonomic/phylogenetic diversity Trait diversity Interaction diversity	
5	Ecosystem functioning	Primary productivity Ecosystem phenology Ecosystem disturbances	
6	Ecosystem structure	Live cover fraction Ecosystem distribution Ecosystem vertical profile	




Vogel, G. (2017). Where have all the insects gone? Science 356:576-579.



Red List Index (RLI)

The Red List Index (RLI) shows trends in overall extinction risk for species, and is used by governments to track their progress towards targets for reducing biodiversity loss.









Programas de seguimiento

- Conceptos generales e indicadores
- Objetivos y diseño
- Uso en ciencia y gestión



Objetivos del seguimiento:

Descripción: ¿Qué está pasando?


Interpretación:¿Por qué está pasando?

- Diseño del muestreo
- Método de cuantificación
- Análisis de datos

- Método científico
- Manejo adaptativo



Esfuerzo controlado



Objetivos del seguimiento:


Descripción: ¿Qué está pasando?

- Diseño del muestreo
- Método de cuantificación
- Análisis de datos



abundancia

Presencia/ausencia Índices de abundancia Densidades Tamaño poblacional



unidad de muestreo

dispersión media

1 2 3 tiempo

Tamaño de muestra: 6

12




Objetivos del seguimiento:


Descripción: ¿Qué está pasando?


Diseño del muestreo

- Estratificación
- Ponderación
- Asignación de esfuerzo











PanEuropean Common Bird **Monitoring Scheme**





Bird monitoring in Europe Home About us

Objetivos del seguimiento:

Descripción

Análisis de

Package 'rtrim'

July 23, 2025

Title Trends and Indices for Monitoring Data

Version 2.3.0

Date 2024-06-21

Description The TRIM model is widely used for estimating growth and decline of animal populations based on (possibly sparsely available) count data. The current package is a reimplementation of the original TRIM software developed at Statistics Netherlands by Jeroen Pannekoek. See

<https://www.cbs.nl/en-gb/society/nature-and-environment/indices-and-trends%</pre> 2d%2dtrim%2d%2d>

for more information about TRIM.

URL https://github.com/SNStatComp/rtrim

https://butterfly-monitoring.net/es






Uso ide indicadores: algunos ejemplos...












Phengaris nausithous

Método de cuantificación

- Presencia/ausencia
- Índices de abundancia
- Densidades
- Tamaño poblacional





1988-2002 vs 2014-2018 (2778 cuadrículas de 10 x10)

DesapareceNo comparada









Método de cuantificación


- Presencia/ausencia
- Índices de abundancia
- Densidades
- Tamaño poblacional





Observación directa











1,000 Kilometers

tendencias

Harju et al. 2021. Human-wildlife interactions 15 (3)

itinerarios

BBS route Political boundary Corvus corax

N. Amer. Deserts

Temp. Sierras


Taiga

20

Water



Cambios numéricos de las aves norteamericanas



Kenneth V. Rosenberg et al. 2019. Science 366:120-124








Método de cuantificación

- Presencia/ausencia
- Índices de abundancia
- Densidades
- Tamaño poblacional











Programas de seguimiento

- Conceptos generales e indicadores
- Objetivos y diseño
- Uso en ciencia y gestión



Objetivos del seguimiento:

Descripción: ¿Qué está pasando?


Interpretación:¿Por qué está pasando?

- Diseño del muestreo
- Método de cuantificación
- Análisis de datos


- Método científico
- Manejo adaptativo



Estructura del método científico



- 1. Las hipótesis deben ser refutables (Criterio de Demarcación). En consecuencia, las buenas hipótesis son las imbatidas, no las imbatibles.
- 2. Se comprueba la veracidad o falsedad de lo predicho
- 3. Volvemos a A, con más experiencia e información.
- 4. Podemos volver a A para refinar nuesta hipótesis









Programas de seguimiento

José Luis Tellería
Grupo de Investigación en Biología Evolutiva
y de la Conservación, Universidad
Complutense, 28040 Madrid, Spain

igracias!